


Mulots et souris

Molaire à tubercules
avec racines




Lérot
Eliomys quercinus

Mulot
Apodemus sylvaticus

Identification de quelques espèces
de micromammifères du
Paléolithique à partir des
caractéristiques de la première
molaire inférieure (m_1)

Campagnols et
lemmings

Molaire à surface
plane découpée en
triangles
sans racines



9 triangles:
CA (court): 2 demi- triangles
CL: 4 triangles
CJ: 3 triangles

7 triangles:
CA: 1 triangle CL
CL: 3 triangles
CJ: 3 triangles



7 triangles:
CA: 2 triangles ouverts
CL: 3 triangles
CJ: 2 triangles

6 triangles:
CA: 1 triangle CL
CL: 3 triangles
CJ: 2 triangles

5 triangles 1/2:
CA (ovale): 1/2 triangle CJ
CL: 3 triangles (non fermés)
CJ: 2 triangles (non fermés)

5 triangles:
CA (court): 2 triangles ouverts
CL: 2 triangles
CJ: 1 triangle

5 triangles:
CA (long): 2 triangles ouverts
CL: 2 triangles
CJ: 1 triangle
Dent de grande taille



Lemming à collier
Disrostonyx torquatus

Campagnol agreste
Microtus agrestis

Campagnol des champs
Microtus arvalis

Campagnol des hauteurs
Microtus gregalis

Campagnol roussâtre
Myodes glareolus

Lemming de Norvège
Lemmus lemmus

Campagnol terrestre
Arvicola terrestris

Pika des steppes
Ochotona pusilla

Lagomorphes
(lièvre, lapin...)

Molaire à crêtes
sans racines

